

Protection biologique de cultures horticoles sous abris hors-gel



HortGel

LES SYSTÈMES DE CULTURE SOUS ABRI FROID



Abri froid = Sans chauffage ou avec une température maximale de 5 à 8°C

Plusieurs cultures ont été identifiées:


- Cultures d'anémones et renoncules pour la fleur coupée, voire autres fleurs hors gel
- La culture en pot de rosiers, et autres (Pieris, aromatiques)
- La culture en pot de Chrysanthèmes et autres vivaces d'automne et aromatiques

Points communs:

- Rotations de cultures avec ou sans vide sanitaire marqué.
- Peu de maîtrise des conditions de production (température, humidité) et changement climatique. De moins en moins de « remise à zero » sanitaire en hiver.
- Problématiques sanitaires communes en termes de maladies et de ravageurs (dont des nouveaux)


3 STATIONS ASTREDHOR

- ASTREDHOR Seine-Manche: culture de chrysanthème et vivaces en pot
- ASTREDHOR Loire Bretagne : culture de rosier et Pieris en pot



- ASTREDHOR Méditerranée : anémones/renoncules et autres fleurs coupées

MÉTHODE DE TRAVAIL



- Objectif Zéro phyto
- Combiner tous les leviers de biocontrôle nécessaires
- Epidémiosurveillance avec



- Evaluation technico-économique des systèmes de culture innovants